



RÉGIONS DE VÉGÉTATION

- | FACIÉS | TYPE DE FORMATION | ESSENCES CARACTÉRISTIQUES PRÉDOMINANTES |
|---|-------------------|---|
| SURFACES PRESQUE SANS VÉGÉTATION | | |
| glaciers et neiges permanentes, etc. | | |
| désert de rocs ou champs de pierres | | lichen - benoîte des toundras - saxifrage |
| toundra rocheuse arctique avec lichen | | lichen - thé du Labrador - cassiope |
| toundra arctique avec arbustes nains - carex - lichen | | bouleau et saule rabougris - carex - airelle - camarine - thé du Labrador |
| toundra haute: carex - herbe et arbustes | | carex - thé du Labrador - calamagrostide - saule et bouleau rabougris |
| toundra alpine avec carex - herbe et arbustes | | cassiope - carex - pâturin des prés - benoîte des montagnes - saule nain |
| TOUNDRAS-TOURBIÈRES | | |
| terrains avec lichen - arbustes - îlots de conifères | | lichen (cladonia) - bouleau et saule nain - épinette noire - mélèze laricin |
| FORÊT OUVERTE | | |
| sols avec couverture de lichen et conifères disséminés | | lichen - épinette noire |
| sols avec couverture de lichen et conifères disséminés | | lichen - épinette - mélèze laricin |
| sols avec arbustes conifères disséminés | | thé du Labrador - épinette noire |
| conifères alternant avec terrains nus et plaques de lichen | | épinette - sapin - kalmie à feuilles étroites |
| conifères disséminés et arbustes feuillus | | épinette - auline rabougris - saule et bouleau |
| arbustes ou herbe alternant avec des conifères | | bouleau et saule nains - fétuque - épinette blanche |
| MARECAGES-TOURBIÈRES | | |
| petits lacs - sols avec couverture de mousse et lichen, lignes de conifères | | sphaigne - carex - épinette noire - mélèze laricin |
| FORÊT BORÉALE | | |
| conifères | | épinette - sapin baumier |
| | | épinette - pin gris - mélèze laricin |
| conifères avec quelques arbres feuillus d'essences boréales | | épinette noire |
| | | peuplier faux-tremble - épinette |
| conifères alternant avec des plaques d'arbustes et de terrains nus | | épinette noire - peuplier faux-tremble |
| | | épinette blanche - peuplier - pin gris |
| conifères et quelques arbres feuillus alternant avec des tourbières et marécages isolés | | pin gris - épinette noire |
| | | épinette noire - mélèze laricin - pin gris - peuplier - carex - sphaigne |
| conifères et quelques arbres feuillus d'essence boréale alternant avec des terrains nus | | épinette blanche - bouleau blanc - sapin concolore |
| | | épinette - pin de Murray |
| conifères et essences conifériennes occidentales | | épinette - pin de Murray |
| | | épinette - pin de Murray |
| conifères avec essences conifériennes et feuillues méridionales | | sapin baumier - épinette - bouleau |
| | | sapin baumier - épinette - bouleau - pin blanc |
| FORÊT DE LA CÔTE DU PACIFIQUE ET DE L'INTÉRIEUR HUMIDE DE LA CORDILLÈRE | | |
| conifères | | sapin de Douglas - pruche de l'Ouest - thuya géant |
| | | épinette de Sitka - pruche de l'Ouest - thuya géant |
| conifères | | pruche de l'Ouest - thuya géant - sapin de Douglas (var. glauca) |
| | | pruche de l'Ouest - thuya géant - sapin de Douglas (var. glauca) |
| FORÊT SUBALPINE | | |
| conifères dont la distribution est souvent clairsemée | | épinette d'Engelmann - sapin concolore - pin de Murray |
| | | tsuga de Patton - sapin gracieux - sapin concolore |

- | FACIÉS | TYPE DE FORMATION | ESSENCES CARACTÉRISTIQUES PRÉDOMINANTES |
|--|-------------------|---|
| FORÊT DU PLATEAU INTÉRIEUR DE LA CORDILLÈRE | | |
| conifères et arbres feuillus d'essences boréales, herbe dans les vallées | | pin de Murray - sapin de Douglas (var. glauca) - peuplier faux-tremble - épinette blanche |
| FORÊT MIXTE DU SUD-EST | | |
| arbres feuillus avec conifères | | érable à sucre - hêtre - chêne - pruche de l'Ouest - pin blanc |
| | | érable à sucre - bouleau jaune - pruche de l'Ouest - épinette - pin blanc |
| conifères et arbres feuillus | | érable à sucre - bouleau jaune - épinette sapin |
| | | épinette rouge - sapin baumier - pruche de l'Est - pin - érable - bouleau |
| FORÊT MÉRIDIONALE DE FEUILLUS | | |
| arbres feuillus | | érable à sucre - hêtre - noyer noir d'Amérique - chêne |
| FORÊT-PARC | | |
| arbres feuillus avec îlots de graminées | | peuplier faux-tremble - chêne à gros fruits - chiendent - stipe |
| | | peuplier faux-tremble - stipe - fétuque |
| conifères avec îlots de graminées | | pin à bois lourd - sapin de Douglas (var. glauca) - chiendent - fétuque |
| PRAIRIES HERBEUSES | | |
| graminées basses | | bouteloue - chiendent - stipe |
| | | chiendent - stipe - pâturin des prés |
| graminées moyennes | | chiendent - bouteloue - stipe |
| | | chiendent - bouteloue - stipe |
| graminées hautes | | barbon |

NOTE: Lorsque l'épinette n'est pas spécifiée, il s'agit des espèces noire et blanche; le "bouleau" n'est pas spécifié, il s'agit des espèces blanche et jaune; le "peuplier" n'est pas spécifié, il s'agit des espèces faux-tremble et baumier; l'érable n'est pas spécifié, il s'agit des espèces rouge et à sucre; le "pin" n'est pas spécifié, il s'agit des espèces rouge et blanche.